

# PK PLUS



**NOMBRE QUÍMICO**  
**CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN**

FOSFITO DE POTASIO  
20% p/p P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>  
16% p/p K<sub>2</sub>O  
3 % p/p ácido salicílico

**CARACTERÍSTICAS**

PK PLUS, es un inductor de defensa que además de corregir deficiencias de potasio en momentos en que la planta lo necesita, potencia los sistemas naturales de defensa de las plantas. El contenido de ácido salicílico amplía el rango de defensa disminuyendo las posibilidades de daño de los patógenos.

Al ser mezclado con fungicidas se logra tener un efecto de potenciación.  
PK PLUS puede ser aplicado vía foliar o bien al suelo.

**RECOMENDACIONES GENERALES DE USO:**

| CULTIVO   | APLICACIONES  |
|---|---|
| Hortalizas<br>Papas<br>Frutales, Cítricos y Paltos<br>Vides<br>Olivos<br>Ornamentales | 3 – 5 aplicaciones según ciclo de producción<br>3 – 5 aplicaciones según ciclo de producción<br>2 aplicaciones en primavera y 1 en otoño<br>2 a 3 aplicaciones desde brotación a cosecha<br>3 aplicaciones entre prefloración y otoño<br>Cada 20 días entre primavera y otoño |

**DOSIS :**

| CULTIVO      | FOLIAR (CC/200L Agua) | SUELO (L/Ha) |
|--------------|-----------------------|--------------|
| Hortalizas   | 600 a 700 cc.         | 7 a 8 L      |
| Papas        | 400 a 600 cc.         | 6 a 8 L      |
| Frutales     | 400 a 600 cc.         | 6 a 8 L      |
| Cítricos     | 400 a 600 cc.         | 6 a 8 L      |
| Paltos       | 400 a 600 cc.         | 6 a 8 L      |
| Vides        | 600 a 1000 cc.        | 7 L          |
| Olivos       | 600 a 1000 cc.        | -            |
| Ornamentales | 600 cc.               | 7,5 L        |

**MODO DE EMPLEO**

- \* Aplicar con ropa protectora, guantes, gafas y respirador apropiado.
- \* No aplicar en horas de máximo calor.
- \* Almacenar en este mismo envase en un lugar fresco y seco.
- \* Mantener fuera del alcance de los niños. Irrita la piel y los ojos.

**INCOMPATIBILIDADES**

\*Es incompatible con aceites minerales, compuestos cúpricos y productos muy alcalinos además de dimetoato y dicofol. Esperar al menos 20 días entre su aplicación y la de productos con incompatibilidad